



11

ALGÈBRE LINÉAIRE

DIAGONALISATION DES MATRICES CARRÉES

INTRODUCTION...

Pour faire clair, l'objectif du chapitre : une matrice étant donnée, savoir si elle est semblable à une matrice diagonale et, le cas échéant, en déterminer une qui convient !

POUR BIEN DÉMARRER...

1. Soient E et F deux espaces vectoriels réels. **Définitions.**

- $f : E \longrightarrow F$ est une application linéaire lorsque :
- Endomorphisme ? Isomorphisme ? Automorphisme ?

- Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$.
 - * Tout sur $\ker(f)$:

- * Tout sur $\text{Im}(f)$:

2. Théorème du rang et application pour la caractérisation des isomorphismes.

3. Si $f : E \longrightarrow F$ est linéaire et injective, alors $\dim(E) \leq \dim(F)$
Si $f : E \longrightarrow F$ est linéaire et surjective, alors $\dim(E) \geq \dim(F)$
Si $f : E \longrightarrow F$ est linéaire et bijective, alors $\dim(E) = \dim(F)$

4. Formules de changement de base :

Dans tout ce chapitre, n désigne un entier naturel non nul et A une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Tout ce qui suit dans le chapitre concerne les matrices carrées. Toutes les notions peuvent être formulées sur les endomorphismes, mais cela n'est plus dans l'esprit du programme de Mathématiques Appliquées. Volontairement, le cours sera conforme au programme, mais les exercices traités pourront utiliser le même vocabulaire sur les endomorphismes.

I ÉLÉMENTS PROPRES D'UNE MATRICE CARRÉE

I.1 DÉFINITIONS ET PREMIERS RÉSULTATS

DÉFINITIONS 1

VALEURS PROPRES, VECTEUR PROPRES ET SPECTRE D'UNE MATRICE CARRÉE

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

D1 Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Le réel λ est **valeur propre de A** lorsqu'il existe $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ tel que :

- ✓ $X \neq 0_{n,1}$
- ✓ $AX = \lambda X$

Un tel vecteur X est un **vecteur propre de A associé à la valeur propre λ**

D2 Le **spectre de A** , noté $\text{Sp}(A)$, est l'ensemble des valeurs propres de A .

Important !

La condition $X \neq 0_{n,1}$ est nécessaire, sinon tous les réels seraient valeur propre de toutes les matrices...

♣ **MÉTHODE 1** ♣ Pour montrer qu'un vecteur X est vecteur propre de A :

- on vérifie que $X \neq 0_{n,1}$,
- on calcule AX pour l'écrire sous la forme qqch $\times X$, le qqch étant alors une valeur propre de A .

EXEMPLE 1

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$. Montrons que le vecteur $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ est vecteur propre de A .

PROPRIÉTÉS 1

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et λ une valeur propre de A . On note $E_\lambda(A) = \{X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) / AX = \lambda X\}$.

P1 $E_\lambda(A)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

P2 $1 \leq \dim(E_\lambda(A)) \leq n$

P3 Des caractérisations :

$$\begin{aligned} (\lambda \text{ est valeur propre de } A) &\iff \ker(A - \lambda I_n) \neq \{0_{n,1}\} \\ &\iff \text{rg}(A - \lambda I_n) \neq n \\ &\iff (A - \lambda I_n \text{ n'est pas inversible}) \end{aligned}$$

P4 Si deux matrices sont semblables, alors elles ont le même spectre et les dimensions de leurs sous-espaces propres sont égales.

Attention !

$E_\lambda(A)$ n'est pas l'ensemble des vecteurs propres associés à λ ... C'est l'ensemble constitué du vecteur nul et de tous les vecteurs propres de A associés à la valeur propre λ .

Vocabulaire

$E_\lambda(A)$ est le sous-espace propre de A associé à la valeur propre λ .

Attention !

Elles n'ont, en général, pas les mêmes vecteurs propres !

★ DÉMONSTRATION :

♣ **MÉTHODE 2** ♣ Pour déterminer une base de $E_\lambda(A)$, on peut :

1. résoudre le système linéaire $AX = \lambda X$, d'inconnue $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$,
2. ou déterminer la dimension de $E_\lambda(A)$ puis trouver une famille libre de bon cardinal...

EXEMPLE 2

Notons $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$. D'après l'exemple précédent, le vecteur $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ est vecteur propre de A associé à la valeur propre 2. Déterminons, deux deux façons différentes, une base de $E_2(A)$.

♣ **MÉTHODE 3** ♣ Pour déterminer les valeurs propres de A :

1. si A est triangulaire (ou diagonale), alors ses valeurs propres sont ses coefficients diagonaux ;
2. si $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, alors on utilise le déterminant pour trouver les réels λ tels que $A - \lambda I_2$ n'est pas inversible ;
3. sinon, on utilise l'algorithme du pivot de Gauss pour trouver les réels λ tels que $\text{rg}(A - \lambda I_n)$ n'est pas maximal (on se ramène au rang d'une matrice triangulaire).

EXEMPLES 3

E1 Les matrices suivantes admettent toutes 0 comme valeur propre :

E2 Déterminons le spectre de la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

E3 La matrice $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ n'admet aucune valeur propre...

E4 Déterminons les valeurs propres de la matrice $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$.

E5 Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Démontrons que $\text{Sp}(A) = \text{Sp}(^tA)$.

À retenir...

◀ Résultat qui peut servir.

I.2 POLYNÔME ANNULATEUR ET VALEURS PROPRES

Voyons maintenant une notion accompagnée d'un résultat qui nous sera, en pratique, très utile.

DÉFINITION 2

POLYNÔME ANNULATEUR D'UNE MATRICE

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $P \in \mathbb{R}[X]$.
Le polynôme P est **annulateur de A** lorsque : $P(A) = 0_n$.

EXEMPLE 4

Après calculs, on trouve que le polynôme $X^2 - X - 2$ est annulateur de la matrice $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

Par conséquent :

$$A^2 - A - 2I_3 = 0_3$$

D'où :

$$A \left(\frac{1}{2}(A - I_3) \right) = I_3$$

Conclusion : la matrice A est inversible et $A^{-1} = \frac{1}{2}(A - I_3)$.

Peut-on donner un autre polynôme annulateur de A ?

✓ **Rigueur !**

~~$\frac{A - I_3}{2}$~~ : cette écriture n'a aucun sens !

✗ **Attention !**

On dira donc toujours **UN** polynôme annulateur de A .

Remarque

Au moins un et donc une infinité !
En effet, si P est annulateur de A , alors pour tout $Q \in \mathbb{R}[X]$, QP est encore annulateur de A ...

THÉORÈME 1

EXISTENCE DE POLYNÔME ANNULATEUR (HP)

Toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ admet au moins un polynôme annulateur non nul.

★

DÉMONSTRATION :

★

PROPRIÉTÉ 2

LIEN VALEUR PROPRE / POLYNÔME ANNULATEUR

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $P \in \mathbb{R}[X]$.
Si P est annulateur de A , alors toute valeur propre de A est racine de P .
Autrement dit, si P est annulateur de A , alors $\text{Sp}(A) \subset \{r \in \mathbb{R} \mid P(r) = 0\}$.
Ou encore : si P est annulateur de A , alors les valeurs propres de A sont parmi les racines de P .

✗ **Attention !**

On a seulement une inclusion !
Toutes les racines d'un polynôme annulateur ne sont pas nécessairement des valeurs propres de A ... Sinon, tout réel serait valeur propre de A .

★

DÉMONSTRATION :

♣ **MÉTHODE 4** ♣ Pour déterminer les valeurs propres de A :

Si l'énoncé fait apparaître un polynôme annulateur de A , alors :

- on cherche les racines de ce polynôme,
- pour chaque racine r trouvée :
 - * soit on résout $AX = rX$, et si l'ensemble des solutions est non réduit au vecteur nul, alors r est valeur propre de A (sinon, r n'est pas valeur propre de A)
 - * soit on justifie / on voit que la matrice $A - rI_n$ n'est pas inversible (en travaillant sur son rang par exemple, pour anticiper la recherche du sous-espace propre avec la méthode 2...), et dans ce cas, r est valeur propre de A (sinon, r n'est pas valeur propre de A)
 - * soit on trouve un vecteur non nul X tel que $AX = rX$, et dans ce cas, r est valeur propre de A .

Important !

L'évènement "l'énoncé donne un polynôme annulateur dont une racine n'est pas valeur propre de A " est quasi-impossible.
En pratique, l'énoncé fournit le *meilleur* polynôme annulateur qui soit...

EXEMPLE 5

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 4 & -8 & 5 \end{pmatrix}$ et on admet que $A^3 - 5A^2 + 8A - 4I_3 = 0_3$.

Déterminons les valeurs propres de A ainsi qu'une base de chaque sous-espace propre associé.

I.3 NOMBRE MAXIMAL DE VALEURS PROPRES

PROPRIÉTÉS 3

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$ (avec $p \in \mathbb{N}^*$) les valeurs propres **distinctes** de A .

P1 **Cas particulier.** Soient $X_1, \dots, X_p$ des vecteurs propres de A associés respectivement aux valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_p$.
Pour tout $k \in \llbracket 1; p \rrbracket$, la famille $(X_1, \dots, X_k)$ est une famille libre de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

P2 **Cas général.** Soient $\mathcal{F}_1, \dots, \mathcal{F}_p$ des familles libres respectivement de $E_{\lambda_1}(A), \dots, E_{\lambda_p}(A)$.
Pour tout $k \in \llbracket 1; p \rrbracket$, la concaténation des familles $\mathcal{F}_1, \dots, \mathcal{F}_k$ est une famille libre de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

À retenir...

- Une famille de $\vec{VP}$ associés à des VP différentes est libre.
- Une concaténation de familles libres de sous-espaces propres associées à des valeurs propres distinctes est une famille libre de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

* DÉMONSTRATION :

P1. Par récurrence...

- **Initialisation.** Pour $k = 1$:
Par définition, puisque X_1 est vecteur propre de A , on a $X_1 \neq 0_{n,1}$.
Par conséquent, la famille (X_1) est libre car constituée d'un unique vecteur non nul.
L'initialisation est vérifiée.
- **Hérédité.** Soit $k \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket$. Supposons que " $(X_1, \dots, X_k)$ est libre" et montrons que " $(X_1, \dots, X_{k+1})$ est libre".
Soient $a_1, \dots, a_{k+1} \in \mathbb{R}$. Supposons que $a_1 X_1 + \dots + a_{k+1} X_{k+1} = 0_{n,1}$. Notons (*) cette égalité.
 - * Multiplions (*) par $A - \lambda_{k+1} I_n$. On obtient, puisque X_{k+1} est vecteur propre de A pour la valeur propre λ (et donc $X_{k+1} \in \ker(A - \lambda_{k+1} I_n)$) :

$$\sum_{i=1}^k a_i (A - \lambda_{k+1} I_n) X_i = 0_{n,1}$$

D'où :

$$\sum_{i=1}^k a_i (A X_i - \lambda_{k+1} X_i) = 0_{n,1}$$

Et comme, pour tout $i \in \llbracket 1; k \rrbracket$, X_i est vecteur propre de A pour la valeur propre λ_i :

$$\sum_{i=1}^k a_i (\lambda_i - \lambda_{k+1}) X_i = 0_{n,1}$$

Mais, par hypothèse de récurrence, la famille $(X_1, \dots, X_k)$ est libre. D'où :

$$\forall i \in \llbracket 1; k \rrbracket, a_i (\lambda_i - \lambda_{k+1}) = 0$$

Et comme les valeurs propres sont distinctes, on a :

$$\forall i \in \llbracket 1; k \rrbracket, \lambda_i \neq \lambda_{k+1}$$

Ce qui donne donc :

$$\forall i \in \llbracket 1; k \rrbracket, a_i = 0$$

Remarque

Il s'agit d'une récurrence finie.

* Par conséquent, (*) équivaut à

$$a_{k+1}X_{k+1} = 0_{n,1}$$

Et comme $X_{k+1} \neq 0_{n,1}$ (c'est un vecteur propre...), on obtient :

$$a_{k+1} = 0$$

On a donc établi :

$$\forall i \in \llbracket 1; k+1 \rrbracket, a_i = 0$$

La famille $(X_1, \dots, X_{k+1})$ est donc libre. L'hérédité est ainsi établie.

P2. Analogie, mais plus lourd à écrire.

★

PROPRIÉTÉS 4

NOMBRE MAXIMAL DE VALEURS PROPRES (HP ?)

P1 Toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ admet au plus n valeurs propres distinctes.

P2 Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ les valeurs propres distinctes de A . On a :

$$\sum_{i=1}^p \dim(E_{\lambda_i}(A)) \leq n$$

Autrement dit :

On dit parfois qu'une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ possède au plus n valeurs propres *comptées avec leur multiplicité géométrique*, la multiplicité géométrique (il existe aussi une multiplicité algébrique, hors programme) d'une valeur propre désignant la dimension de l'espace propre associé.

★

DÉMONSTRATION :

P1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Notons p le nombre de valeurs propres distinctes de A et $X_1, \dots, X_p$ des vecteurs propres associés à ces p valeurs propres respectivement.

D'après la propriété précédente, la famille $(X_1, \dots, X_p)$ est une famille libre de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. Ainsi :

$$\text{Card}(X_1, \dots, X_p) \leq \dim(\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}))$$

D'où :

$$p \leq n$$

P2. Pour tout $i \in \llbracket 1; p \rrbracket$, notons $\mathcal{B}_i$ une base de $E_{\lambda_i}(A)$. Puisqu'une base est en particulier une famille libre, d'après la propriété précédente (cas général), la concaténation des bases $\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_p$ est une famille libre de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

Notons $\mathcal{F}$ cette famille libre obtenue par concaténation. On a ainsi :

$$\text{Card}(\mathcal{F}) \leq n$$

Mais, puisque $\mathcal{F}$ est la concaténation des familles $\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_p$, on a également :

$$\begin{aligned} \text{Card}(\mathcal{F}) &= \sum_{i=1}^p \text{Card}(\mathcal{B}_i) \\ &= \sum_{i=1}^p \dim(E_{\lambda_i}(A)) \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{pour tout } i \in \llbracket 1; p \rrbracket, \mathcal{B}_i \text{ est une base de } E_{\lambda_i}(A) \end{array} \right\}$$

$$\text{Conclusion : } \sum_{i=1}^p \dim(E_{\lambda_i}(A)) \leq n.$$

★

Rappel...

Soit $\mathcal{F}$ une famille de vecteurs de E .
 • Si $\mathcal{F}$ est libre, alors $\text{Card}(\mathcal{F}) \leq \dim(E)$.
 • Si $\mathcal{F}$ est génératrice de E , alors $\text{Card}(\mathcal{F}) \geq \dim(E)$.

Remarque

P1 est un cas particulier de **P2**. En effet, puisque pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $\dim(E_{\lambda_i}(A)) \geq 1$, on a :
 $\sum_{i=1}^p \dim(E_{\lambda_i}(A)) \geq p$. Et par transitivité, on retrouve : $p \leq n$.

♣ MÉTHODE 5 ♣ Pour déterminer quelques valeurs propres de A :

1. si A n'est pas inversible (on le remarque si A admet une ligne/colonne nulle ou une ligne/colonne combinaison linéaire des autres; ou si $\ker(A) \neq \{0_{n,1}\}$ ou si $\text{rg}(A) \neq n$), alors 0 est valeur propre de A ;

2. si la somme des coefficients de chacune des lignes de A est égale au même réel s , alors s est valeur propre de A et

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \text{ est un vecteur propre associé ;}$$

3. puisque $\text{Sp}'(A) = \text{Sp}(A)$, si la somme des coefficients de chacune des colonnes de A est égale au même réel s , alors s est valeur propre de A (mais nous n'avons pas d'expression générale d'un vecteur propre associé).

✗ Attention !

Il est rare de pouvoir trouver toutes les valeurs propres d'une matrice de cette façon...

EXEMPLE 6

Déterminons les valeurs propres de la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & -6 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ ainsi qu'une base de chaque sous-espace propre associé sans résoudre aucun système.

II DIAGONALISATION DES MATRICES CARRÉES

DÉFINITION 3

MATRICE DIAGONALISABLE

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

La matrice A est **diagonalisable** lorsqu'il existe deux matrices $P, D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que :

- ✓ P est inversible,
- ✓ D est diagonale,
- ✓ $A = PDP^{-1}$

Autrement dit :

Une matrice est diagonalisable lorsqu'elle est semblable à une matrice diagonale.

Pour info...

Un endomorphisme f est diagonalisable lorsqu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de f est diagonale.

THÉORÈME 2

CONDITION NÉCESSAIRE ET SUFFISANTE DE DIAGONALISABILITÉ D'UNE MATRICE CARRÉE

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

La matrice A est diagonalisable si, et seulement si, il existe une base de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ constituée de vecteurs propres de A .

Et, dans ce cas, si :

- ✓ D est diagonale constituée des valeurs propres de A (dans l'ordre des vecteurs propres correspondant dans ladite base),
- ✓ P est la matrice de passage de la base canonique vers cette base de vecteurs propres de A ,

alors : $A = PDP^{-1}$.

* DÉMONSTRATION : Raisonnons par double implication et travaillons avec les applications linéaires... Notons f l'endomorphisme de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ canoniquement associé à A .

⇒ Supposons que A est diagonalisable et considérons deux matrices $P, D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, avec P inversible et D diagonale telles que $A = PDP^{-1}$.

Notons $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ les coefficients diagonaux (rangés de haut en bas dans cet ordre) de D . Puisque les matrices A et D sont semblables, d'après la propriété 4, elles représentent toutes deux le même endomorphisme.

Astuce du chef

L'avantage de travailler avec l'endomorphisme de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ canoniquement associé à A , et pas celui d'un autre EV : les objets sont les mêmes ! En effet, f n'est autre que l'application $X \mapsto AX$. Et ainsi, les vecteurs propres de f sont exactement les vecteurs propres de A .

Par conséquent, il existe une base $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ telle que $D = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$. Mais, D étant diagonale, on obtient :

$$\forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket, f(e_i) = \lambda_i e_i$$

Or $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ est une base de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, donc, nécessairement, les vecteurs $e_1, e_2, \dots, e_n$ sont tous non nuls. On en déduit que, pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, λ_i est valeur propre de f (et donc de A) et que e_i est un vecteur propre de f (et donc de A) associé à la valeur propre λ_i .

Conclusion : $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ est une base de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ constituée de vecteurs propres de A .

⇐ Supposons qu'il existe une base de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ constituée de vecteurs propres de A .

Considérons $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une telle base et, pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, notons λ_i la valeur propre à laquelle est associé le vecteur propre e_i .

On a ainsi :

$$\forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket, f(e_i) = \lambda_i e_i$$

Et ainsi :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Notons alors $D = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ et $P = P_{\text{bc}, \mathcal{B}}$. D'après la formule de changement de base (propriétés 3 - P2), on a ainsi :

$$\begin{aligned} \text{Mat}_{bc}(f) &= P_{\text{bc}, \mathcal{B}} \times \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) \times P_{\mathcal{B}, \text{bc}} \\ &= P D P^{-1} \end{aligned} \quad \left(P_{\mathcal{B}, \text{bc}} = P_{\text{bc}, \mathcal{B}}^{-1} \right)$$

Autrement dit :

$$A = P D P^{-1}$$

Conclusion : A est diagonalisable.

★

Remarque

Les $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ne sont pas nécessairement distinctes !

Rappel...

Se souvenir de la manière dont on remplit une matrice...

EXEMPLE 7

Reprenons la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & -6 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ de l'exemple 6. Montrons que A est diagonalisable et donnons une matrice P inversible ainsi qu'une matrice D diagonale telles que $A = P D P^{-1}$.

⚠ Attention !

On veille bien à l'ordre dans lequel sont rangés les valeurs propres dans D et les vecteurs propres correspondant dans P ...

THÉORÈME 3

THÉORÈME SPECTRAL

Toute matrice symétrique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est diagonalisable.

★

DÉMONSTRATION : Nous manquons d'outils pour démontrer le cas général ; mais le cas $n = 2$ est facile ! En exercice ?

★

EXEMPLE 8

Les matrices suivantes sont diagonalisables : $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, les matrices $\begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$ pour tout réel a ...

Et, pour finir, deux résultats hors programme dont la démonstration est à savoir refaire !

THÉORÈME 4

CONDITION SUFFISANTE DE DIAGONALISABILITÉ D'UNE MATRICE CARRÉE (HP)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Si A possède n valeurs propres distinctes, alors A est diagonalisable.

★ DÉMONSTRATION :

Important !

Il faut savoir refaire le raisonnement mis en place !

PROPRIÉTÉ 5

CAS D'UNE UNIQUE VALEUR PROPRE (HP)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

On a :

$$\left. \begin{array}{l} A \text{ diagonalisable} \\ A \text{ possède une unique valeur propre } \lambda \end{array} \right\} \Rightarrow A = \lambda I_n$$

★ DÉMONSTRATION :

★ Classique ! ★

Résultat classique, à savoir redémontrer très rapidement si besoin.

Autrement dit :

Une matrice diagonalisable avec une unique valeur propre est nécessairement multiple de l'identité (la réciproque est évidemment vraie).

EXEMPLE 9

Puisque la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ est triangulaire, ses valeurs propres sont ses coefficients diagonaux. Cette matrice admet donc 3 comme unique valeur propre.

Par l'absurde : supposons que A est diagonalisable. Il existe alors une matrice inversible P telle que : $A = PDP^{-1}$,

$$\text{où } D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

On a ainsi :

$$\begin{aligned} A &= P \times 3I_3 \times P^{-1} \\ &= 3PP^{-1} \\ &= 3I_3 \end{aligned}$$

Or, $A \neq 3I_3$: contradiction !

Conclusion : la matrice $\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ n'est pas diagonalisable.

Exemple classique d'utilisation de la réduction (diagonalisation ou trigonalisation) d'une matrice A : le calcul simplifié des puissances de A . Mais dans quels types d'exercices peut-on rencontrer ceci ?